



# Standard Inguinalhernie



A = Pat. ohne Komorbidität, jung, mobil, einseitig, kleine Hernie

B = Pat. mit Komorbidität, alt, wenig mobil, zweiseitig


# Standard Abdominalhernie



A = Pat. ohne Komorbidität, kleine Hernie, keine EDA nötig


B = Pat. mit Komorbidität, alt, wenig mobil, grössere Hernie mit Netz und EDA


# Standard Varizen





A = Pat. ohne Komorbidität, wenig ausgeprägt, einseitig: Femoralisblock/Tumeszenz  
 A = Pat. ohne Komorbidität, ausgeprägt: Spinalanästhesie; Intubationsnarkose  
 B = Pat. mit Komorbidität, alt, wenig mobil

# Standard Cholecystektomie




 Ambulante Abklärung bei HA, keine präoperative Sprechstunde

 Ambulante Abklärung bei Hausarzt, präoperative Sprechstunde

 Operation, Hospitalisation


# Standard Kolon-/Sigmaresektion



- Ambulante Abklärung, ggf. Kolonoskopie, ggf. pulm/cardiol Konsil
- Stationär für Aufklärung und/oder Abführen falls nicht Zuhause abgeführt
- Operation, Hospitalisation


A = Pat. ohne Komorbidität, jung, mobil; A' = bei transrektaler Resektion  
 B = Pat. mit Komorbidität, alt, wenig mobil, Karzinom

# Standard Rectumresektion



- Ambulante Abklärung inkl. Kolonoskopie, CT thorakoabdominal, Becken-MRI ggf. pulm/cardiol Konsil; Interdisziplinäres Tumorboard
- ggf. Neoadjuvate Rx-Cx
- Abführen, Stoma-Stelle einzeichnen
- Operation, Hospitalisation
- Stomaberatung
- evt. Kuraufenthalt


# Standard Hämorrhoidektomie, Staplerhämorrhoidopexie, Fissur, Fistel



A = Pat. ohne Komorbidität, Fissur, Fistel, Staplerhämorrhoidopexie

(B = Ausnahme: Pat. mit Komorbidität, Mehrzipfel, komplexe Fistel, grosse Wunde)

# Standard Thyroidektomie




- Ambulante Abklärung, evt. Endokrinologie; präop. Sprechstunde
- Operation, Hospitalisation
- Prä- und postop Laryngoskopie durch HNO

A = Pat. mit offener Thyroidektomie  
 B = Pat. mit transoraler Thyroidektomie



# Standard Fundoplicatio; Gastropexie



A = Pat. ohne Komorbidität, Fundoplicatio bei Reflux

B = Pat. mit Komorbidität, Hiatushernie-, up-side down stomach mit Gastropexie