

Perioperative Standards der Chirurgie RSE (August 2012)

Grundsätzliches

Kein Patient und keine Operation ist genau gleich: die Standards sollen nur eine Richtlinie geben für den Ablauf im Regelfall

A = Pat. ohne Komorbidität, jung, mobil, sozial integriert


B = Pat. mit Komorbidität, alt, wenig mobil, sozial ohne Unterstützung

Fadenentfernung im Zeitraum um "12d" grundsätzlich zwischen 10-14d

Nachkontrollen (NK) werden je nach Operateur und Patient zwischen 6-12 Wochen festgelegt


(Burgdorf) bedeutet, dass der Eingriff prinzipiell in Burgdorf durchgeführt wird. Meist wegen der Infrastruktur. Es bedeutet, dass Operateure auch von Langnau in Burgdorf operieren

Standard Inguinalhernie




Rem: Aamb = Pat. ohne Komorbidität, jung, mobil, einseitig, kleine Hernie

Standard Abdominalhernie




Rem: Belastungsgrenzen und Bauchgurt von Ausmass des Befundes abhängig


Standard Varizen




Standard Cholecystektomie




Standard Appendektomie







Standard Hämorrhoiden Fissuren




Standard Anale Fisteln



-  Ambulante Abklärung, Anästhesie Sprechstunde
-  1. Operation: Spaltung oder Seton-Einlage, ambulant
-  2. Operation: Spaltung oder Fistelresektion und z.Bsp. Mucosa-Flap: Hospitalisation
-  Entlassung


Standard Kolonresektion



- Ambulante Abklärung, Koloskopie, ggf. pulm/cardiol Konsil
- Stationär Abklärung, (Anästhesie Visite), evt. Abführen
- Operation, Hospitalisation
- Entlassung

Rem: Belastung u.a. abhängig von Laparotomie-Grösse

Standard Rectumresektion / Abdominoperineale Resektion (Burgdorf)




□ Ambulante Abklärung, Kolonoskopie, MRI od Endosonographie, ggf. pulm/cardiol Konsil; evt. Neoadjuvante Radio-Chemotherapie





□ Stationär Abklärung, Anästhesie Visite, Abführen

□ Operation, Hospitalisation

□ Entlassung

Standard Rectopexie (Burgdorf)



-  Ambulante Abklärung, Anästhesie Sprechstunde
-  Stationär Abklärung, (Anästhesie Visite)
-  Operation, Hospitalisation
-  Entlassung


Standard Thyroidektomie (Burgdorf)

NK
Fäden

NK
(Substitution)


NK
Op

Kein Eltroxin bis zum Histologieresultat




- Ambulante Abklärung: mindestens Sono, TSH, fT3; Anästhesie Sprechstunde
- Stationär Abklärung, Anästhesie Visite
- Operation, Hospitalisation
- Entlassung

Standard Fundoplikatio / Gastropexie (Burgdorf)




- Ambulante Abklärung: Ösophago-Gastroskopie; KM-CT Oberbauch; Ösophagus pH-Metrie, -Manometrie, Anästhesie Sprechstunde
- Stationär Abklärung, Anästhesie Visite
- Operation, Hospitalisation
- Entlassung





Standard Milzresektion




Standard

Nebennierenresektion (Burgdorf)




-  Ambulante Abklärung: hormonelle Aktivität; Anästhesie Sprechstunde
-  Stationäre Aufnahme und Abklärungen
-  Operation, Hospitalisation
-  Entlassung





Standard Empyemdrainage / Decortication (Burgdorf)




Standard Pleurodese





(Burgdorf)



-  Ambulante Abklärung: (Pneumo); Anästhesie Sprechstunde
-  Stationär Abklärung, Anästhesie Visite
-  Operation, Hospitalisation
-  Entlassung

Standard Lungenresektion (Burgdorf)



-  Ambulante Abklärung: Pneumologie, Anästhesie Sprechstunde
-  Stationär Abklärung, Anästhesie Visite
-  Operation, Hospitalisation
-  Entlassung